

# Gastroenterology Specialties, PC

## Colonoscopia con Golytely Instrucciones

**NECESITA traer un adulto que te puede manejar as su casa tras su procedimiento. No se permite el uso de transportación como un autobús, taxi, Uber, o Lyft. Si no tienes ningún conductor, su procedimiento estará cancelado.**

### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE MEDICAMENTOS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**

- Medicamentos para prescripción dietas como **Phentermine** deberían estar sostenidos por **10 días** antes del procedimiento. Medicamentos inyectables como Mounjaro, Ozempic, Trulicity, Wegovy deberían estar sostenidos por **7 días** antes.
- **Medicinas anticoagulantes** como Warfarin (Coumadin), Plavix (Clopidogrel), Pletal (Cilostazol) Heparin, Aggrenox (Dipyridamole), Eliquis (Apixaban) o Effient (Prasugrel) **necesitaran estar sostenidos hasta 5 días antes del procedimiento.**
- Pare antagonista opioide como Naltrexone **3 días** antes de su procedimiento.
- Pare todas las vitaminas, suplementos herbarios, aceite de pescado, ibuprofeno, hieiro y cualquier otro medicamento de venta libre **5 días antes.**

### **EL PREPARACION INTESTINAL – Golytely**

La preparación intestinal es una prescripción que estuvo enviada a su farmacia. Por favor recógelolo lo más pronto posible.

### **Usted NECESITA PREPARESE EL DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:**

1. **Usted no puede comer comida sólida el día antes de su colonoscopia.** Por el **ENTERO DIA solamente puede tomar LIQUIDOS CLAROS.** Ejemplos de líquidos claros: Agua, caldo, jugos claros sin pulpa, café negro, te, bebidas deportivas, agua saborizada, Kool-Aid, soda, gelatina. Entre el día tome todo que sea posible. Nada colorado rojo, azul, o morado.
2. No tomes ningún tipo de diuréticos como Furosemide, Lasix, Aldactone, Spironolactone, o Hydrochlorothiazide.
3. **Toma su Preparación:**
  - En la mañana agrega agua a la línea de llenar en la jarra, mezcla bien y refrigeras hasta las 5:00p.m.
  - A las 5:00p.m empieza a tomar un vaso de 8 onzas del Golytely cada 15-20 minutos hasta que mitad (½) de la jarra esta terminada. Refrigeraras el resto.
  - Sigue tomando líquidos claros el resto de la noche para prevenir deshidratación.

### **EL DIA DE SU PROCEDIMIENTO:**

1. Cuatro (4) horas antes de salir por su procedimiento, tome el resto de la Golytely y 16 onzas de cualquier tipo de líquido claro durante la próxima hora, después PARE TOMANDO. Si tomas dentro las 2 horas de su tiempo para registrar, su procedimiento podría ser demorado o reprogramado.
2. Solamente toma medicamentos por hipertensión/ presión alta, o convulsiones.
3. Antes de su procedimiento, un inhalador está bien para usar.
4. No tomes más de ½ de su dosis regular de insulina en la mañana de su procedimiento. No tomes ningún medicamento oral para diabetes en la mañana de su procedimiento.
5. Traiga su conductor, y sus cartas de identificación y seguro.