

Gastroenterology Specialties, PC

Colonoscopia con Suprep Instrucciones

NECESITA traer un adulto que te puede manejar as su casa tras su procedimiento. No se permite el uso de transportación como un autobús, taxi, Uber, o Lyft. Si no tienes ningún conductor, su procedimiento estará cancelado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE MEDICAMENTOS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- Medicamentos para prescripción dietas como **Phentermine** deberían estar sostenidos por **10 días** antes del procedimiento. Medicamentos inyectables como Mounjaro, Ozempic, Trulicity, Wegovy deberían ser sostenidos por **7 días** antes.
- **Medicinas anticoagulantes** como Warfarin (Coumadin), Plavix (Clopidogrel), Pletal (Cilostazol) Heparin, Aggrenox (Dipyridamole), Eliquis (Apixaban) o Effient (Prasugrel) **necesitaran estar sostenidos hasta 5 días antes del procedimiento.**
- Pare antagonista opioide como Naltrexone **3 días** antes de su procedimiento.
- Pare todas las vitaminas, suplementos herbarios, aceite de pescado, ibuprofeno, hieiro y cualquier otro medicamento de venta libre **5 días antes.**

EL PREPARACION INTESTINAL – SUPREP

La preparación intestinal es una prescripción que estuvo enviada a su farmacia. Por favor recógelolo más pronto posible.

Usted NECESITA PREPARESE EL DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

1. **Usted no puede comer comida sólida el día antes de su colonoscopia.** Por el **ENTERO DIA solamente puede tomar LIQUIDOS CLAROS.** Ejemplos de líquidos claros son: Agua, caldo, jugos claros sin pulpa, café negro, te, bebidas deportivas, agua saborizada, Kool-Aid, soda, gelatina. Entre el día tome todo que sea posible. Nada colorado rojo, azul, o morado. **NO COMIDAS SOLIDAS, LECHE O PRODUCTOS LACTOSAS.** Si comes el día antes de su procedimiento su colon no estará limpio, y su procedimiento estará cancelado.
2. No tomes ningún tipo de diuréticos como Furosemide, Lasix, Aldactone, Spironolactone, o Hydrochlorothiazide.
3. **Toma su Preparación:**
 - A las 5:00 PM, echa uno (1) 6 onzas botella del Suprep dentro el contenedor de plástico provisto. Agrega fría agua para llenar el contenedor hasta la línea arriba de 16 onzas y mezcla. Toma todo el líquido del contenedor.
 - Toma dos (2) más contenedores de 16 onzas de agua dentro la próxima hora.
 - Sigue tomando líquidos claros el resto de la noche para prevenir deshidratación.

EL DIA DE SU PROCEDIMIENTO:

1. Cuatro (4) horas antes de salir por su procedimiento, toma la segunda dosis del Suprep y dos (2) más contenedores de 16 onzas de agua durante la próxima hora, después PARE TOMANDO. Si tomas dentro las 2 horas de su tiempo para registrar, su procedimiento podría ser demorado o reprogramado.
2. Solamente toma medicamentos por hipertensión/ presión alta, o convulsiones.
3. Antes de su procedimiento, un inhalador está bien para usar.
4. No tomes más de mitad (½) de su dosis regular de insulina en la mañana de su procedimiento. No tomes ningún medicamento oral para diabetes en la mañana de su procedimiento.
5. Traiga su conductor, y sus cartas de identificación y seguro.